

Течно минерално ѓубриво
24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат

НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно минерално ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење) и со фолијарна апликација.

ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат се препорачува за примена на почетокот на вегетацијата и во фазата на формирање на лисната маса кај земјоделските култури. 24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат може да се применува и во другите фази на раст и развој на земјоделските култури бидејќи содржи и азот како хранлива материја, поради што може да се користи и за редовно ѓубрење.

Со апликацијата на 24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат се спречува формирање мали абнормални лисја, се подобрува целиот пораст на растението, што резултира со правилен развој на растенијата, односно со давање стабилни и квалитетни приноси.

Се препорачува 24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат да се аплицира со водата за наводнување. Во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација.

Кај градинарските и кај полјоделските култури се препорачува да се започне со фолијарна апликација веднаш штом посевите добијат доволно лисна маса за апсорпција на растворот, додека кај виновата лоза и кај овошните насади се препорачува апликација за време на вегетативниот циклус, меѓутоа за време на цветањето и непосредно пред бербата пожелно е да не се врши прскање. Најдобар ефект се постигнува со комбинација на системот за микронаводнување и фолијарна апликација.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преку систем капка по капка и со полевање

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски култури	Почеток на вегетацијата, до фаза на масовно цветање и плодносење	2-3 апликации	1,5 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Полјоделски култури	Во тек на вегетацијата (веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода)	2-3 апликации	1,5 l ѓубриво со најмалку 2000-3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода, сè до средина на фазата пораст на плод-зрно	2-3 апликации	2 l ѓубриво со најмалку 3000-4000 l вода

*Течно минерално ѓубриво
24% Цинк хелат со 10% амониум нитрат*

Фолијарна апликација

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски култури	Почеток на вегетацијата, до фаза на масовно цветање	2 апликации на 10-14 дена	200 ml ѓубриво со 100 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетација	2 апликации на 10-14 дена	200 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури	По отворање на пупките	1-2 апликации на 10-14 дена	250 ml ѓубриво со 100 l вода
	По берба, пред опаѓање на лисјата	1 апликација	
Винова лоза	По отворање на пупките, сè до средина на фазата пораст на зрно	2-3 апликации	200 ml ѓубриво со 100 l вода

Ефектот од фолијарната апликација е подобар во раните утрински или во вечерните часови.

НАПОМЕНА

Во растворите за фертиригација може да се меша со повеќето ѓубрива, освен со ѓубривата кои имаат силна кисела и алкална реакција. Не се препорачува да се меша во ист резервоар со раствори од калциум амониум нитрат и со калциум нитрат. Може да се употребува поединечно или во комбинација со многу пестициди, меѓутоа пред секоја употреба неопходно е да се прочита упатството на производителот на средствата за заштита. Не смее да се меша со бордовска чорба и со други силни алкални средства за заштита.

СКЛАДИРАЊЕ

На температура повисока од +10°C.

РОК НА УПОТРЕБА

2 години.

СОСТАВ	
Цинк (Zn)	(4,0 ± 0,3) %
Zn(NH ₄) ₂ EDTA	(22,0 ± 1,0) %
NH ₄ NO ₃	(9,7 ± 0,7) %