

**Течно минерално ѓубриво
3% Цинк со 2% бор**

НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење) и преку фолијарна апликација.

ПРИМЕНА

3% Цинк со 2% бор се користи за коригирање на дефицитот од цинк и бор кај земјоделските култури и за подобрување на квалитетот на производот. Особено се препорачува на почетокот на вегетацијата, во фазата пред и за време на цветање на земјоделските култури, како и во време на почетокот на образување плодови. Дефицитот на бор и цинк често се поврзува и со недостатокот на влага во почвата, поради што 3% Цинк со 2% бор се препорачува за аплицирање со водата за наводнување, а особено преку системот за микронаводнување од каде што, многу лесно и ефикасно се извлекува. Во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација.

При оптимална исхрана со макрохранливи елементи преку почвата и со оптимална влага во почвата, со примена на 3% Цинк со 2% бор преку фолијарна апликација се постигнува одличен ефект.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преку систем капка по капка и со полевање

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски култури	Почеток на вегетацијата, до фаза на масовно цветање	2-3 апликации	2 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Полјоделски култури	Во тек на вегетацијата (веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода)	1-2 апликации	1-2 l ѓубриво со најмалку 2000-3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода, сè до средина на фазата пораст на плод-зрно	2-3 апликации	2 l ѓубриво со најмалку 3000-4000 l вода

Течно минерално ѓубриво
3% Цинк со 2% бор

Фолијарна апликација

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и почетно плодносење	2 апликации на 10-15 дена	150-200 ml ѓубриво со 100 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетацијата или врзување на плодови	1-2 апликации на 10-15 дена	150-200 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури	По отворање на пупките/цветање/врзување на плод	1-2 апликации на 10-15 дена	150-200 ml ѓубриво со 100 l вода
Винова лоза	По отворање на пупките, сè до средина на фазата пораст на плод-зрно	2 апликации на 10-15 дена	150-200 ml ѓубриво со 100 l вода

Ефектот од фолијарната апликација е подобар во раните утрински или во вечерните часови.

НАПОМЕНА

3% Цинк со 2% бор може да се употребува поединечно или во комбинација со многу пестициди, меѓутоа неопходно е пред секоја употреба да се прочита упатството на производителот на средствата за заштита. Не смее да се меша со бордовска чорба и со други силни алкални средства за заштита.

СКЛАДИРАЊЕ

На температура повисока од +10°C.

РОК НА УПОТРЕБА

2 години.

СОСТАВ	
Цинк (Zn) ¹	(3,0 ± 0,3) %
Бор (B) ²	(2,0 ± 0,2) %

¹ Цинк во едетатна форма - Zn(NH₄)₂EDTA

² Борна к-на во моноетаноламин (МЕА)