

Биостимулатор NEMAKIL 35 AL

(Концентриран природен екстракт од Quillaja saponaria,
богат со тритерпенски сапонини и со полифеноли)

НАМЕНА

За контрола на паразитските нематоди и за спречување на нивното штетно дејство врз земјоделските култури.

ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

NEMAKIL 35 AL претставува 100% природен и водорастворлив растителен екстракт добиен од Quillaja saponaria, автохтоно дрво кое се среќава во Чиле. Производот е природно богат со тритерпенски сапонини кои дејствуваат нематоцидно на паразитските нематоди, контактно или преку апсорбирање. NEMAKIL 35 AL обезбедува висока контрола на ектопаразитските и на ендопаразитските нематоди и спречува тие штетно да дејствуваат на кореновиот систем на земјоделските култури. Освен што тритерпенските сапонини имаат нематоцидно дејство, тие дејствуваат и како растителни хормони, особено преку стимулирање на порастот на кореновиот систем. Обезбедувањето поголема и подобро развиена коренова маса кај растението овозможува подобра обезбеденост со вода и со хранливи материји, поздрави растенија, намалување на негативниот ефект од нематодите, односно – стабилни и квалитетни приноси. За да може да се постигне целосен ефект со NEMAKIL 35 AL, потребно е аплицирањето да се изврши кога почвата е близу до горната граница на лесно достапна вода за растенијата (полски воден капацитет), но не и кога почвата е презаситена со вода. Кај микронаводнувањето најдобар ефект се постигнува доколку средството се аплицира со последната четвртина од препорачаното количество вода за залевање. Во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува апликација со полевање, инектори и со хидробур директно во коренот на растенијата или со распрскувачи на површината на почвата, по што е потребно кратко залевање за внесување на средството во почвата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Најдобар ефект со аплицирање на NEMAKIL 35 AL може да се постигне со хемигација, односно со аплицирање преку системот за микронаводнување. Со цел поуниформна дистрибуција на средството во коренот на растенијата и на целата површина, потребно е системот да биде правилно дизајниран, односно да дистрибуира рамномерно количество вода од секој уред (редовна проверка на исправноста на капалките или на микропрскалката). За да се спречи повратен тек на водата и на аплицираното средство во доводот на вода (изворот на вода), задолжително се поставува и неповратен вентил. При користење на овој начин на аплицирање потребно е да се зачува точниот сооднос на водата и средството, утврден според препораките подолу (пример: при единствена апликација треба да се употреби 2,5 l средство со 300–500 l вода на површина од 1000 m²). За да може да се постигне целосен ефект, пожелно е аплицирањето да се изврши кога почвата е близу до горната граница на лесно достапна вода за растенијата (полски воден капацитет), но не и кога почвата е презаситена со вода.

**Биостимулатор
NEMAKIL 35 AL**

(Концентриран природен екстракт од Q. saponaria,
богат со тритерпенски сапонини и со полифеноли)

Затоа, најдобро е апликацијата да се изврши кога треба да се даде последната четвртина од препорачаното количество вода за залевање, но апликацијата да не трае повеќе од 30 минути. По апликацијата може да се продолжи со залевање за да се исчисти системот, но не повеќе од 15 минути.

По аплицирање на средството не треба да се врши залевање најмалку во следните 24 часа.

Преку систем за микронаводнување (капка по капка или микродождење)

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски и цвеќарски култури	од 15. ден по расадувањето до 70. ден по расадувањето, во периодот на прифаќање на растението и на развој на кореновиот систем	3–4 апликации (по 1 апликација на секои 15 дена)	0,8 l со 100–150 l вода со една апликација
Винова лоза и овошни култури	веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода	2 апликации (по 1 апликација на секои 15 дена)	1,4–1,5 l со 200–250 l вода со една апликација
	при интензивно присуство на паразитски нематоди се врши уште една апликација по бербата, со цел нивниот број да се одржи на ниско ниво	1 апликација	2,5–3 l со 300–500 l вода со една апликација

Забелешка: На потешки почви апликацијата може да се изведе и единечно, односно 1–4 дена пред расадувањето на градинарските култури или штом дозволат условите за аплицирање вода кај овошките и кај виновата лоза. Се аплицира NEMAKIL 35 AL во количство од 2,5 до 3 l со 300–500 l вода на 1000 m². Кај градинарските култури, во одредени случаи, особено при силен интензитет на паразитски нематоди, може да се изврши комбинација од апликација пред расадување и апликација во тек на вегетација.

Методот со полевање е уште еден прилично прецизен метод на апликација. Ефикасно дејство со средството се постигнува само доколку влагата во почвата е близу до полскиот воден капацитет, односно почвата не е презасетена со вода. Кај овој метод не е потребно дополнително залевање по извршената апликација бидејќи препорачаното количество раствор ја директно се аплицира во коренот на растенијата. Слично е и кај начинот на аплицирање со приклучна механизација со инјектори или со хидробур, при што единствено олеснето е аплицирањето.

При користење распрскувачи за аплицирање на NEMAKIL 35 AL, се препорачува тие да бидат монтирани така што ќе формираат лента по должината на редот и ќе зафаќаат површина од 30 до 50% од коренот на културата. Како и кај претходните начини на аплицирање, потребно е влагата во почвата да биде обезбедена близу до полскиот воден капацитет. По аплицирањето на средството по површината на почвата се препорачува залевање со вода во траење од 10 до 15 минути (не се препорачуваат површински техники на наводнување), со цел целосно внесување на средството во почвата.

**Биостимулатор
NEMAKIL 35 AL**

(Концентриран природен екстракт од Q. saponaria,
богат со тритерпенски сапонини и со полифеноли)

Со полевање, инјектори или со распрскувачи

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m ² со 1 апликација
Градинарски и цвеќарски култури	2–4 дена пред расадување или 15 дена по расадување	1 апликација	2,5–3 l со 300–500 l вода со една апликација
Винова лоза и овошни култури	интензивна активност на кореновиот систем	1 апликација	2,5–3 l со 300–500 l вода со една апликација

Забелешка: Доколку дозволува методот на апликација, бројот на апликациите може да се зголеми слично како и кај микронаводнувањето, при што дозирањето на крајот повторно треба да изнесува вкупно 2,5–3 l, а препорачаната концентрацијата на растворот треба да се движи во границите од 0,5 до 1%.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ

Се полни резервоарот до половина со вода и се додава NEMAKIL 35 AL според планираната доза и согласно со препорачаниот начин за аплицирање. Се дополнува резервоарот со преостанатото количество вода и се промешува. NEMAKIL 35 AL е целосно водорастворлив, па се препорачува мешање со мал интензитет за да не се создава пена. Вака подгответниот раствор треба да се аплицира најдоцна во период од 3 часа по извршената подготовка. Кај системите за мирконаводнување кај коишто се користат пумпи за хемигација (фертиригација), резервоарот се полни само со NEMAKIL 35 AL, а фертиригаторот се поставува на бараната концентрација којашто треба да се додаде во водата за наводнување. За правилна примена на методот со хемигација, се предлага претходно калибрирање на фертиригаторот, односно утврдување на времето за кое одредено количество течност од градуиран сад (подоцна резервоарот) ќе се вметне во системот за мирконаводнување.

Каренца: Не е апликативно.

НАПОМЕНА

NEMAKIL 35 AL претставува растителен екстракт кој е целосно растворлив во вода, што овозможува да се користи во различни програми за фертиригација и за прихрана на земјоделските култури, како и негова комбинација со средства за заштита на растенијата. Неопходно е пред секоја употреба да се прочита упатството од производителот на ѓубривата или од средствата за заштита коишто се користат во програмата. Се препорачува да не се аплицира со ниеден производ без претходно тестирање на нивната компатибилност. За да се види компатибилноста, се препорачува микс од средствата со препорачаните дози од производителите, и тоа во траење не помалку од 30 минути.

Доколку не сте сигурни во компатибилноста на производите, најдобро е NEMAKIL 35 AL да го аплицирате поединечно. Апликаторот мора да биде обезбеден со целосна опрема за заштита при апликација (заштитна облека, заштитни очила и заштитни ракавици).

Биостимулатор NEMAKIL 35 AL

(Концентриран природен екстракт од Q. saponaria,
богат со тритерпенски сапонини и со полифеноли)

Токсичност: Предупредување: Производот предизвикува привремено оштетување на очите. Производот е штетен при проголтување или при апсорбирање преку кожата. Внимавајте да не дојде во контакт со очите или со облеката. Носете заштитна опрема при ракување. Измијте се со големо количество сапун и со вода по ракување и пред јадење или пиење. Отстранете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Не го аплицирајте производот директно во површинските води или во нивна близина. Не ги загадувајте површинските води при апликација, при отстранување на производот и/или при чистење на опремата за апликација.

СКЛАДИРАЊЕ

Трајност: Чувајте го во затворена и во проветрена просторија, во оригиналното пакување, на темно место и при температура повисока од $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Не ги загадувајте водата, храната или сточната храна при складирање и при отстранување на производот. Чувајте го вон дофат на деца и на домашни миленици. Не се препорачува користење на празната амбалажа за друга употреба.

РОК НА УПОТРЕБА

2 години

СОСТАВ

Состав	Месај
Тритерпенски сапонини	min. 6,0 % w/w
Содржина на цврсти материи	33,0 – 37,0° Brix
Цврсти органски материи	(30,0 \pm 5,0) % w/w
Цврсти неоргански материи (пепел)	(5,0 \pm 2,0) % w/w