НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно минерално ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење), со полевање и со folijarna апликација.

ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

NPK 3-0-25 може да се применува неколку пати во текот на вегетацијата, а особено се препорачува при формирање и при созревање на плодовите, кога се јавуваат и најголемите потреби. Може да се применува и во другите фази на раст и развиток на земјоделските култури бидејќи содржи и азот како хранлива материја, но и кај култури кои имаат потреба од калиум во текот на целата вегетација (калифилни култури).

Примената на NPK 3-0-25 овозможува правилно оформување и зреење на плодовите, што резултира со стабилни и со квалитетни приноси. Се препорачува NPK 3-0-25 да се аплицира со водата за наводнување, и тоа преку системот за микронаводнување, а во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација. При оптимална исхрана преку почвата со сите хранливи елементи и при оптимална влага во почвата, со фолијарната апликација се постигнува одличен ефект.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преку систем капка по капка и со полевање

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m^2 со 1 апликација
Градинарски култури	Плодоносење и созревање на плодовите	7-8 апликации на 5-6 дена	4-5 l ѓубриво со најмалку 5000 l вода
Полјоделски култури	Во тек на вегетацијата (веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода)	2-3 апликации	3 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Пораст и созревање на плод-зрно	6-7 апликации на 6-7 дена	4-5 l ѓубриво со најмалку 5000 l вода

Фолијарна апликација

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m^2 со 1 апликација
Градинарски култури	Плодоносење и созревање на плодовите	2-3 апликации на 10-14 дена	300-400 ml ѓубриво со 100 l вода
Полјоделски култури	Во тек на вегетацијата	1-2 апликации	200 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури и винова лоза	Пораст и созревање на плод-зрно	2-3 апликации на 10-14 дена	300-400 ml ѓубриво со 100 l вода

НАПОМЕНА
Во растворите за фертиригација може да се меша со сите ѓубрива. Може да се меша и со повеќето пестициди, при што прво се раствораат пестицидите, па потоа со мешање се додава ѓубривото, меѓутоа пред секоја употреба неопходно е да се прочита упатството на производителот на средствата за заштита.

СКЛАДИРАЊЕ
На температура повисока од +10°C.

РОК НА УПОТРЕБА
5 години.

СОСТАВ	
Вкупен азот (N)	(3,0 ± 0,3) %
Калиум (K_2O)[1]	(25,0 ± 1,0) %

[1] Калиумот потекнува од Калиум ацетат.