НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно минерално ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење), со полевање и со фолијарна апликација.

ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

NPK 3-10-22 може да се применува во сите фази на раст и развиток на растенијата, а особено се препорачува пред почетокот на цветање, во фазата на цветање и на формирање плодови.

Со редовна апликација на NPK 3-10-22 ефикасно се дејствува на недостигот на фосфор и на калиум кај растенијата, се овозможува правилен развиток на коренот, се подобрува порастот на растенијата, што резултира со стабилни и со квалитетни приноси. NPK 3-10-22 истовремено ги задоволува потребите и за азот, кој претставува уште еден битен макрохранлив елемент неопходен за правилна исхрана на растенијата.

Се препорачува NPK 3-10-22 да се аплицира со водата за наводнување, и тоа преку системот за микронаводнување, а во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација. При оптимална исхрана преку почвата со сите хранливи елементи и при оптимална влага во почвата, со фолијарната апликација се постигнува одличен ефект.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преку систем капка по капка и со полевање

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m^2 со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и плодоносење	7 апликации на 5-6 дена	5 l ѓубриво со најмалку 5000 l вода
Пољоделски култури	Во тек на вегетацијата (веднаш штом дозволат условите за аплицирање вода)	2-3 апликации	3 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Врзување плод*, пораст и созревање на плод-зрно	7 апликации на 5-6 дена	4-5 l ѓубриво со најмалку 5000 l вода

* Во оваа фаза фертиригацијата може да започне доколку дозволуваат условите на терен (сува пролет и обезбедување вода за наводнување).

Фолијарна апликација

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m^2 со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и плодоносење	2-3 апликации на 10-14 дена	400 ml ѓубриво со 100 l вода
Пољоделски култури	Во тек на вегетацијата	1-2 апликации	200 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури и винова лоза	Цветање и плодоносење	2-3 апликации на 10-14 дена	400 ml ѓубриво со 100 l вода

Ефектот од фолијарната апликација е подобар во раните утрински или во вечерните часови.

НАПОМЕНА
Во растворите за фертиригација може да се меша со сите ѓубрива. Може да се меша и со повеќето пестициди, при што прво се раствораат пестицидите, па потоа со мешање се додава ѓубривото, меѓутоа пред секоја употреба неопходно е да се прочита упатството на производителот на средствата за заштита.

СКЛАДИРАЊЕ
На температура повисока од +10°C.

РОК НА УПОТРЕБА
5 години.

СОСТАВ	
Вкупен азот (N)	(3,0 ± 0,3) %
Фосфор (P_2O_5)	(10,0 ± 0,7) %
Калиум (K_2O)[1]	(22,0 ± 1,0) %

[1] Калиумот потекнува од Калиум ацетат и од Дикалиум хидроген фосфат.