

## НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно минерално ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење) и со фолијарна апликација.

## ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

НРКВ 10-6-8-0,5 + МЕ, покрај основните хранливи елементи кои се неопходни за правилен раст и развој на земјоделските култури, содржи и бор, поради што особено се препорачува кај градинарските култури, а може да се применува и кај овошките, виновата лоза и кај полјоделските култури.

НРКВ 10-6-8-0,5 + МЕ содржи и микрохранливи елементи (Cu, Mn, Zn), со што се овозможува избалансирана исхрана на земјоделските култури.

НРКВ 10-6-8-0,5 + МЕ може да се применува во сите фази на раст и развој на растенијата, а особено се препорачува во фазата на почетен вегетативен пораст, во фазата на масовно цветање и на почетокот на образување плодови. Како резултат на апликацијата на НРКВ 10-6-8-0,5 + МЕ, растенијата правилно се развиваат, цветаат, заврзуваат плодови, односно даваат стабилни и квалитетни приноси. Дефицитот на бор често се поврзува и со недостигот на влага во почвата, поради што НРКВ 10-6-8-0,5 + МЕ се препорачува за аплицирање со водата за наводнување, а особено со микронаводнување. Во случај кога не се применува микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација. Најдобар ефект се постигнува со комбинација на микронаводнување и фолијарна апликација.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

**Преку систем капка по капка и со полевање**

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m <sup>2</sup> со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и почетно плодносење	3 апликации на 4-5 дена	3 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетацијата или формирање на плодови	2-3 апликации	2-3 l ѓубриво со најмалку 2000-3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Заврзување и пораст на плод-зрно*	3 апликации на 6 дена	3 l ѓубриво со најмалку 4000 l вода

\*Во оваа фаза фертиригацијата може да започне доколку дозволуваат условите на терен (сува пролет и обезбедување вода за наводнување).

*Течно минерално ѓубриво  
NPKB 10-6-8-0,5 + ME*

**Фолијарна апликација**

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m <sup>2</sup> со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и почетно плодносење	2-3 апликации на 10-14 дена	300 ml ѓубриво со 100 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетацијата или формирање на плодови	2 апликации	300 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури и винова лоза	Цветање и пораст на плод-зрно	2-3 апликации на 10-14 дена	400 ml ѓубриво со 100 l вода

Ефектот од фолијарната апликација е подобар во раните утрински или во вечерните часови.

**НАПОМЕНА**

NPKB 10-6-8-0,5 + ME може да се употребува поединечно или во комбинација со многу пестициди. Редоследот на растворање е: вода – NPKB 10-6-8-0,5 + ME – пестициди. Не смее да се меша со бордовска чорба и со други силни алкални средства.

**СКЛАДИРАЊЕ**

На температура повисока од +10°C.

**РОК НА УПОТРЕБА**

5 години.

СОСТАВ	
Вкупен азот (N)	(10,0 ± 0,7) %
Фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	(6,0 ± 0,5) %
Калиум (K <sub>2</sub> O)	(8,0 ± 0,5) %
Бор (B)	најмалку 0,500 %
<b>Микроелементи во хелатна форма</b>	
Cu, Mn, Zn	